


**TEST DO SAMODZIELNEJ DIAGNOSTYKI PRZED PRZYJĘCIEM LEKU INVENTUM MAX**

	<p>Lek Inventum Max zawiera syldenafil, przeznaczony jest do stosowania w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.</p> <p><b>Lek jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn (w wieku powyżej 18 lat), którzy mają problemy z erekcją. Jeżeli nie spełniasz przynajmniej jednego z powyższych warunków, ten lek NIE jest dla Ciebie!</b></p> <p>Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę.</p>
--	---

Zaburzenia erekcji należą do najczęstszych zaburzeń seksualnych występujących u mężczyzn. Mogą być związane z wiekiem oraz wywołane przyjmowanymi lekami i/lub występowaniem chorób układu krążenia, miażdżycy, cukrzycy, chorób neurologicznych, a także nadużywaniem alkoholu i paleniem papierosów. Zaburzenia erekcji mogą występować częściej u pacjentów z chorobą tętnic wieńcowych, dlatego zaleca się poddanie ocenie medycznej w celu prewencji chorób układu krążenia oraz modyfikacji stylu życia.

<b>Przed przyjęciem leku Inventum Max pacjent powinien upewnić się, czy którykolwiek ze stanów wymienionych w tabeli poniżej został u niego zdiagnozowany i czy przyjmuje wymienione w tabeli leki.</b>	<b>TAK lub NIE WIEM</b>	<b>NIE</b>
Przyjmowanie leków stosowanych w chorobach serca i naczyń takich jak: - nitrogliceryna (np. Nitrocard, Nitromint, Perlinganit Sustonit), - monoazotan izosorbidu (np. Effox, Mono Mack Depot, Mononit, Monosan, Olicard), - molsydomina (np. Molsidomina WZF), - lek przeciwniedokrwenny: nikorandyl, - pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum). Leki wymienione powyżej są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Przyjmowanie <b>azotynu amylu</b> lub <b>azotanu amylu</b> (wykorzystywanych jako używki np. w celu zwiększenia doznań seksualnych).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Przyjmowanie <b>riocyguatu</b> (np. Adempas) lub <b>sydenafilu</b> stosowanych w leczeniu nadciśnienia płucnego (np. Revatio, Granpidam, Remidia, Mysildecard, Silungo).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Przyjmowanie leku <b>rytonawir</b> (stosowanego w leczeniu zakażeń wirusem HIV).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Przyjmowanie <b>leków alfa-adrenolitycznych</b> stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty takich jak: - <b>doksazosyna</b> (np. Adadox, Apo-Doxan, Cardura, Doxagen, Doxalong, Doxanorm, Doxar, Doxazosin, Doxonex, Doxorion, Dozox, Kamiren, Zoxon) - <b>tamsulosyna</b> (np. Adatam, Apo-Tamis, Bazetham, Duitam, Duodart, Dutamsol, Duotix, Dudaprostam, Dutasteride, Dutatev, Dutrozen, Findarts Duo, Landulosin, Fokusin, Marumax, Miktosan, OMI-TAM, Omnic, Omsal, Prostamnic, Ranlosin, Suprostitv, Symlosin SR, Tadumix, Tamduro, Tamiron, TamisPRAS, Tamoptim, Tamsudil, Tamsiger, Tamsugen, Tamsulosin, Tamduro, Tanyz, Twinpros, Uprox, Urostat, Unisol, Vesomni), - <b>alfuzosyna</b> (np. Alfabax, AlfuLEK, Alfurion, Afluzostad, Alugen, Dalfaz), - <b>terazosyna</b> (np. Hytrin, Kornam, Setegis), - <b>silodosyna</b> (np. Pirseo, Sidarso, Silodosin, Silodyx, Urorec).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Przyjmowanie <b>antybiotyków</b> (leków przeciwbakteryjnych) takich jak: - <b>erytromycyna</b> (np. Davercin, Erythromycinum TZF), - <b>klarytromycyna</b> (np. Apiclar, Fromilid, Klabax, Klabion, Klabiotic, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar), - <b>telitromycyna</b> (np. Ketek), - <b>cyprofloksacyna</b> (np. Ciphin, Ciprinol, Ciprobay, Cipronex, Cipropol, Proxacin).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stosowanie leków takich jak: - <b>itrazonazol</b> (np. Ipozumax, ItraGen, Itrax, Itrakast, Itromyx, Orungal, Trioxal), - <b>ketokonazol</b> (np. Ketokonazol, Ketoconazole Hasco, Ketoconazole HRA), - <b>pozakonazol</b> (np. Noxafil, Ossmiq, Posaconazol, Posaconazole), - <b>flukonazol</b> (np. Candifluc, Diflucan, Flucofast, Fluconazin, Fluconazole, Flucorta, Flumycon, Fluxazol, Locaring, Mycomax, Mycosyst).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Ciężkie choroby serca objawiające się:</b> - bólem w klatce piersiowej, brakiem tchu, kołataniem serca po wejściu na drugie piętro w ciągu 10 sekund lub dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut, - bólem w klatce piersiowej podczas stosunku płciowego. <b>Inne choroby serca</b> , takie jak: np. choroba wieńcowa, wady zastawkowe, niewydolność serca. - Zaburzenia rytmu serca (przyspieszona akcja serca, nierówna akcja serca).	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
<b>Przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy zawał serca lub udar mózgu lub zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca.</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zawroty głowy, wrażenie omdlewania, <b>niskie ciśnienie krwi</b> (w spoczynku poniżej 90/50 mmHg).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Wysokie ciśnienie krwi</b> (w spoczynku powyżej 160/100 mmHg).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki</b> , takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Nagle pogorszenie widzenia lub utrata wzroku.</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa</b> (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), <b>szpiczak mnogi</b> (choroba nowotworowa szpiku kostnego) lub <b>białaczka</b> (choroba nowotworowa krwi). <b>Zaburzenia krzepnięcia</b> (takie jak hemofilia).	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
<b>Anatomiczne zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego</b> (objawiająca się skrzywieniem prącia).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Choroba wrzodowa</b> , której objawy uległy pogorszeniu w ciągu ostatnich 7 dni (ból w nadbrzuszu, wzdęcia, odbijania, nudności, wymioty).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Niewydolność wątroby</b> , w tym ciężkie zaburzenia czynności wątroby.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Zaburzenia czynności nerek.</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Wynik testu:</b>	Jedna lub więcej odpowiedzi TAK lub NIE WIEM	Wszystkie odpowiedzi NIE
<b>Decyzja:</b>	<b>Pacjent NIE MOŻE przyjąć leku Inventum Max bez konsultacji z lekarzem</b>	<b>Pacjent MOŻE przyjąć lek z syldenafilem. W celu wyboru odpowiedniej dawki należy wypełnić część testu dotyczącą wyboru dawki.</b>

Jeśli na wszystkie pytania pacjent udzielił odpowiedzi „NIE” należy odpowiedzieć na pytania poniżej, aby dokonać wyboru odpowiedniej dawki leku.



Jeśli nadal nie jest Pan pewien, czy może zastosować lek Inventum Max lub ma Pan problem z wyborem dawki, przez użyciem leku może Pan skonsultować się z farmaceutą.